BEST AVAILABLE-COPY

Rec'd PCT/PTO 11 MAR 2005

FR03/02713

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

REC'D 28 NOV 2003

10/527664

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 9 SEP. 2003

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23



ı er depor EVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UT Code de la propriété intellectue



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Féléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



REMISE DES PIÈCES		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 540 W /	
DATE	Réservé à l'INPI	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE	
	EPT 2002	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE	,
N° D'ENREGISTREMENT PI			
Nº D'ENREGISTRÉMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN		Cabinet REGIMBEAU	
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE		20, The the Chazenes	
PAR LINE	1 3 SEP.	P. 2002 75847 PARIS CEDEX 17	
Vos références poi		FRANCE	.
(facultatif)			
Confirmation d'un	64 D20360 NT dépôt par télécopie	☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie	
D BATURE DE LA	A DEMANDE	Cochez l'une des il cesse guivantes	
Demande de bro	والمراجعة المنافضة متناه الماحات المنتقف بالمحدودة ومديد المنتودات منازير		(A)
Demande de ce		n	
Demande division			
	Demande de brevet initiale		
	ide de certificat d'utilite initiale d'une demande de		
<u> </u>	n Demande de brevet initiale	Date	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IVENTION (200 caractères ou		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N°	
Transporter var		Page ou promisation	
		Pays ou organisation Date \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	ntérieure française		,
S DEWANDEUR		Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	>
Nom	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	>
Nom ou dénominati	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénominati Prénoms	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Coches (jiné dos 2 cases) ion sociale	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique	
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Coches (jiné dos 2 cases) ion sociale	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES	
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez l'une dos 2 gases) ion sociale	Date No S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez l'une dos 2 gases) ion sociale	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES	
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez l'une dos 2 gases) ion sociale	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 180036147	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez l'une dos 2 gases) ion sociale le Rue	Date No S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN Code APE-NAF	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez (june dos 2 cases) ion sociale ue F Rue Code postal et ville	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 180036147	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou	NTÉRIEURE FRANÇAISE (Cochez l'une dos 2 gases) ion sociale le Rue	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 180036147	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège	NTÉRIEURE FRANÇAISE LOcchez Lune dos 2 gases) ion sociale ue F Rue Code postal et ville Pays	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 180036147 Zone d'activité de Courtaboeuf - 3, avenue des Tropiques 91940 LES UIL	DE:
Nom ou dénominati Prénoms Forme juridiqu N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Nationalité N° de télépho	NTÉRIEURE FRANÇAISE LOcchez Lune dos 2 gases) ion sociale ue F Rue Code postal et ville Pays	Date N° S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne morale Personne physique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 180036147 Zone d'activité de Courtaboeuf = 3, avenue des Tropiques 91940 LES UIL FRANCE	DE:



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UNE TÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI	The second section of the sect			
DATE					
LEU 13 SEPT 2002					
N° D'ENREGISTREMENT PARIS B					
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0211416					
Vos références p	our ce dossier :				
The second secon		239864 NT			
Nom					
Prénom					
Cabinet ou Société					
		Cabinet REGIMBEAU			
N °de pouvoir	permanent et/ou	***************************************			
de lien contra	ctuel				
Adresse	Rue	20, rue de Chazelles			
71010336	Code postal et ville				
	Pays	75847 PARIS-CEDEX 17			
N° de téléphoi		01 44 29 35 00 01 44 29 35 99			
Nº de télécopi		info@regimbeau.fr			
Action to the second second second	onique (facultatif)	mooreginocau.ii			
WEIGH		des transferre sont adequenterant des perchants physiques			
Les demandeu	irs et las inventeurs	□ Oui			
sont les mème	s personnes	M Non : Cans ce ses remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)			
CE PERSONAL DE	The second of the second	During now the a mande to brings by the mans division of the storms bond			
	Établissement immédiat	X			
	ou établissement différé				
Baiamant i sh	taun talah a	Uniquement pour les perconnes physiques effectuent elles-mêmes leur propre dépôt			
	lonné de la redevance	Oui			
	,	□ Non			
E REDUCTION	214 A240A				
dec Gedenas	er.≘3	Uniquement your tea personnes physiques			
		Requise pour la première fois pour cette invention (jeindre un avis de non-imposition) Obtenue autérieurement à ce dépôt pour cette invention entre de non-imposition ()			
		- The copie of the line invention proper interest the copie of the			
		décision d'admission à l'ossistance gratuite ou indiquer sa référence). 🗚 📗 📗			
Si vous trez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
SIGNATURE D	The state of the s	THE STREET OF THE STREET AND ADDRESS OF THE STREET OF THE			
or da mand	ataire	VISA DE LA PRÉFECTURE			
	j á du gignejsire)	GU DE L'HIPP			
j	1				
- Y	122				
[-/) 92-1001					

La présente invention concerne un procédé pour mesurer l'activation d'une cellule effectrice appartenant au système immunitaire ou modifiée in vitro par un anticorps monoclonal (AcMo) ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

L'immunothérapie à l'aide d'anticorps polyclonaux ou monoclonaux est en passe de devenir un des aspect les plus importants de la médecine. En revanche, les résultats obtenus lors d'essais cliniques apparaissent contrastés. En effet, il peut s'avèrer que l'anticorps monoclonal ne soit pas suffisamment efficace. Aujourd'hui, la recherche s'oriente sur le fragment Fcy de l'immunoglobuline afin d'améliorer les propriétés des anticorps. A terme, cela devrait permettre l'obtention d'anticorps qui interagissent et activent les récepteurs des cellules effectrices (macrophage, lymphocyte T, H et NK).

15

20

25

30

L'activité biologique de certaines immunoglobulines G est dépendante de la structure des oligosaccharides présents sur la molécule, et notamment sur sa partie Fc. Les molécules IgG de toutes les sous-classes humaines et murines possèdent un Noligosaccharide fixé au domaine CH₂ de chaque chaîne lourde (au résidu Asn 297 pour les IgG humaines). L'influence de ce résidu glycannique sur la capacité de l'anticorps à interagir avec des molécules effectrices (Fc récepteurs et complément) a été démontrée. L'inhibition de glycosylation d'une IgG1 humaine, par culture en présence de Tunicamycine, provoque par exemple une diminution de 50 fois de l'affinité de cet anticorps pour le récepteur FcyRI présent sur les monocytes et macrophages (Leatherbarrow et al, 1985). La fixation au récepteur FcyRIII est également affectée par la perte de carbohydrates sur l'IgG, puisqu'il a été décrit qu'une IgG3 non

glycosylée est incapable d'induire une lyse de type ADCC par l'intermédiaire du récepteur FcyRIII des cellules NK (Lund et al, 1990).

Mais, au-delà de la présence nécessaire de ces résidus glycanniques, c'est plus précisément l'hétérogénéité de leur structure qui peut aboutir à des différences dans la capacité à engager des fonctions effectrices. Des profils de galactosylation variables en fonction des individus (IgG1 humaines sériques) ont été observés. Ces différences reflètent probablement des disparités dans l'activité des galactosyltransférases et autres enzymes entre les clones cellulaires de ces individus (Jefferis et al, 1990). Alors que cette hétérogénéité normale des processus post-traductionnels génère différentes glycoformes (même dans le cas d'anticorps monoclonaux), elle peut conduire à des structures atypiques associées à certains états pathologiques comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, pour lesquelles une proportion importante de résidus agalactosylés a été mise en évidence (Parekh et al, 1985).

Devant la complexité posée par la relation existante entre les différentes structures glycanniques et l'activité des anticorps, il serait utile de pouvoir discriminer rapidement quels sont les anticorps efficaces et permettre ainsi de sélectionner des lignées cellulaires produisant des anticorps ayant une meilleur efficacité ou des propriétés spécifiques dans l'activation ou l'inhibition de certains composants du système immunitaire.

Dans la demande FR 0004685 du 12 avril 2000 (LFB), nous avions décrit un nouveau procédé de préparation d'un anticorps monoclonal capable d'activer les cellules effectrices exprimant le FcyRIII. Dans ce procédé, on teste des anticorps monoclonaux provenant d'hybridomes ou de lignées transfectées dans un mélange réactionnel comprenant les cellules cibles desdits anticorps, des cellules effectrices comprenant des cellules exprimant le FcyRIII et des IgG polyvalentes. Ainsi, on peut déterminer le pourcentage de lyse des cellules cibles et sélectionner des anticorps monoclonaux qui activent les cellules effectrices provoquant une lyse significative des cellules cibles

(activité ADCC de type FcγRIII). Par exemple, la partie Fab de l'anticorps anti-D va se fixer sur l'antigène Rhésus D porté par les hématies. Suite à cette fixation, sa partie Fc se fixe alors sur le récepteur Fc gamma RIII ou CD16 de la cellule effectrice (cellule NK). Ce « sandwich » induit la sécrétion de substances chimiques de type perforines qui vont lyser le globule rouge. Il s'agit donc d'une cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (CCDA) ou ADCC en anglais. Pour se rapprocher des conditions physiologiques, le test est effectué en présence d'immunoglobulines polyvalentes humaines.

- Dans le cadre de l'invention, on a trouvé que la fixation d'un anticorps sur son ligand peut induire une activation de la cellule Jurkat transfectée CD16 induisant la sécrétion d'IL2. Une forte corrélation est observée entre la sécrétion d'IL2 par Jurkat CD16 et l'activité ADCC médiée par le CD16 des cellules effectrices.
- L'invention propose l'utilisation du test jurkat CD16 par mesure d'IL2 sécrétée comme alternative aux tests ADCC, en particulier pour un suivi ou le criblage d'activité biologique d'anticorps à usage thérapeutique.

20 Description

25

.5

Ainsi, la présente invention se rapporte à un procédé pour mesurer l'activation d'une cellule effectrice appartenant au système immunitaire, transformée ou non, par un anticorps monoclonal (AcMo) ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

: 1

En entend par cellule transformée, une cellule modifiée génétiquement de sorte à exprimer un récepteur, en particulier le récepteur CD16.

De préférence, on utilise une lignée Jurkat transfectée avec un vecteur d'expression codant pour le récepteur CD16 comme cellule effectrice. Cette lignée est particulièrement avantageuse car elle est immortalisée et se développe indéfiniment dans des milieux cultures.

5

15

20

25

30

Parmi les cytokines que l'on peut quantifier au moins une cytokine sélectionnée parmi IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6..., TNFa et IFNγ. On choisit avantageusement l'interleukine IL-2.

10 Le taux de cytokine produite est un marqueur d'activation ou d'inhibition des cellules effectrices.

De préférence le taux d'interleukine IL2 sécrétée reflète la qualité de l'anticorps fixé par le récepteur CD16 quant à son intégrité (fonction FC) et à son efficacité (site antigénique) de liaison à l'antigène. La mesure du taux d'IL2 est corrélée à une activité du type ADCC.

Dans un autre aspect, l'invention concerne un procédé pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

Ce procédé est particulièrement adapté pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal de spécificité anti-Rh D du globule rouge humain.

Dans un autre aspect, l'invention concerne un procédé pour évaluer la capacité d'une cellule à produire un anticorps monoclonal efficace, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et

de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

Ce procédé peut être mise en œuvre pour des cellules utilisées pour la production d'anticorps thérapeutiques, telles que CHO, YB2/0, les cellules lymphoblastoïdes humaines, les cellules d'insectes et les cellules de myélomes murines.

Ce procédé peut également être appliquée à l'évaluation de la production d'AcMo par des plantes transgéniques ou de mammifères transgéniques.

10

15

5

Dans un aspect complémentaire, l'invention vise un procédé pour évaluer l'efficacité et de l'intégrité d'anticorps polyclonaux après une étape ou plusieurs étape de purification, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps purifié et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

Les procédés décrits ci-dessus peuvent éventuellement être réalisés en présence d'immunoglobulines humaines (IVIg).

A titre d'exemple, on sélectionnera les anticorps pour lesquels une augmentation supérieure à 100%, 250%, 500%, ou 1000% du taux de libération d'IL-2 est observée par rapport au contrôle en absence d'anticorps ou un anticorps donné comme référence négative.

L'invention vise également l'utilisation du procédé décrit ci-dessus pour sélectionner des anticorps efficace pour un traitement thérapeutique.

A l'inverse, l'invention vise également à évaluer la capacité de réponse des cellules effectrices du patient lorsqu'elles sont mises en présence d'un anticorps monoclonal ou polyclonal donné destiné à traiter le patient et qu'elles sont mises dans les conditions décrites de l'invention.

5

Légende

Figure 1 : Description du test ADCC CMN.

Les cellules mononuclées en présence de Tégéline (IVIg) sont incubées avec les anticorps anti-Rhésus D et des hématies Rhésus + (cible). Après une nuit à 37°C, on mesure la lyse des hématies par mesure de l'hémoglobine relarguée dans le milieu réactionnel.

Figure 2: Description du test ADCC NK

Les cellules NK purifiées sont incubées avec les anticorps anti-Rhésus D et des hématies Rhésus + (cible). Après une nuit à 37°C, on mesure la lyse des hématies par mesure de l'hémoglobine relarguée dans le milieu réactionnel.

Figure 3: Résultats ADCC NK et inhibition par l'anti-CD16 « 3G8 ».

20

Figure 4 : Description du test Jurkat CD16.

Des cellules Jurkat CD16 sont mélangées avec différents anticorps anti-D en présence d'hématies rhésus + et de PMA. Après une nuit d'incubation, la libération d'IL-2 dans le surnageant est quantifiée par ELISA.

25

Figure 5 : Résultats du test Jurkat CD16.

Commentaires : les anticorps positifs en ADCC-NK induisent une sécrétion d'IL2 en présence de Jurkat CD16 et de leur cible.

Exemple 1: Test Jurkat CD16

Anticorps témoins :

Anticorps polyclonaux WinRho, anticorps monoclonal DF5-EBV, anticorps monoclonal DF5-YB2/0

Principe:

5

Ce test estime la capacité des anticorps anti-D à se fixer sur le récepteur CD16 (Fc gamma RIII) exprimé sur les cellules Jurkat CD16 et à induire la secrétion d'IL2.

10 Ce test consiste à mettre en contact en P96 : les anticorps anti-D, les hématies Rhésus positives traitées à la papaïne, les cellules Jurkat CD16 et du PMA.

Après une nuit d'incubation à 37°C, on centrifuge les P96 et on dose dans le surnageant la quantité d'IL2 secrétée.

Mode opératoire

15 Matériel

Anticorps témoins positif: Poly-D WinRho, DF5 YB2/0.

Anticorps témoins négatifs : DF5

Hématies Rhésus positif

Cellules Jurkat CD16

20 Kit dosage IL2 : Quantikine de chez R/D.

Methode

Traitement à la papaïne des hématies.

1ml de culot d'hématies incubé avec 1ml d'une solution de papaïne (1mg/ml) diluées en PBS incubée 10mn à 37°C. Puis 3 lavages en H2O-NaCl 0.15M.

- 25 Mélange réactionnel :
 - -Anticorps: 50µl d'une dilution à 150ng/ml en IMDM 5% SVF
 - -PMA 50µl d'une dilution à 40ng/ml en IMDM 5% SVF
 - -Hématies traitées à la papaïne. 50µl à 8 106/ml en IMDM 5% SVF
 - -Jurkat CD16. $50\mu l$ à 2x106/ml en IMDM 5% SVF
- 30 Incubation 1 nuit à 37°C

Puis centrifugation des plaques, prélèvement de 100µl de surnageants et dosage d'IL2 avec le kit commercial. lecture à 450nm.

On donne les valeurs (en pg/ml) sous forme d'histogramme pour chaque échantillon.

Exemple 2: Corrélation in vitro entre ADCC et libération d'IL-2 de Jurkat CD16.

Pour cette étude, 3 anticorps monoclonaux anti-D ont été comparés.

5

25

30

10 Mab DF5-EBV a été produit par des Lymphocytes B humain obtenus chez un donneur immunisé D-négatif et immortalisés par transformation avec EBV. Cet anticoprs a été utilisé comme contrôle négatif étant donné qu'il a été montré qu'il est incapable d'éliminer les globules rouges rhésus positifs de la circulation lors d'un essai clinique. L'anticorps monoclonal (Mab) DF5-YB2/0 a été obtenu en exprimant la séquence primaire de EBV-DF5 dans la lignée YB2/0. L'anticorps monoclonal R297 et d'autres anticorps recombinants ont également été exprimés dans YB2/0.

On a testé ces anticorps in vitro pour leur capacité à induire une lyse des globules rouges traités à la papaïne en utilisant des cellules PBL comme effecteur.

Tous les tests ont été effectués en présence d'immunoglobulines humaines (IVIg) de sorte à reconstituer les conditions physiologiques.

On pense que les IVIg se lient avec une haute affinité au FcgammaRI (CD64). Les deux Mab DF5-YB2/0 et R297 induisent une lyse des globules rouges à un niveau comparable à celui des anticorps WinRho. En revanche, le Mab DF5-EBV est complètement inefficace.

Dans une deuxième série d'expérience, des cellules NK purifiées et des globules rouges non traités ont été utilisés comme effecteur et cibles respectivement. Après 5 heures d'incubation, les Mabs antiD-R297 et DF5-YB2/0 se sont montrés capables de provoquer la lyse des globules rouges, alors que DF5-EBV reste inefficace.

Dans ces deux expériences, la lyse des globules rouges a été inhibée par Mab 3G8 dirigé contre le FcgammaRIII (CD16).

Pris ensemble, ces résultats démontrent que l'ADCC provoquée par Mab R297 et Mab DF5-YB2/0 implique le FcgammaRIII exprimé à la surface des cellules NK.

Dans le cadre de l'invention, une troisième série d'expériences a mis en valeur un test in vitro à l'aide de cellule Jurkat CD16 pour évaluer l'efficacité d'anticorps anti-D. Les Mab ont été incubés pendant la nuit avec des globules rouges rhésus positifs et des cellules Jurkat CD16. La libération d'IL-2 dans le surnageant à été évaluée par ELISA. Une forte corrélation entre l'ADCC et l'activation des cellules Jurkat a été observée, ce qui implique que ce test peut être utilisé pour faire la discrimination des Mabs anti-D en fonction de leur réactivité envers FcgammaRIII (CD16).

10

En conclusion, ces données montrent l'importance des modifications posttraductionnelles de la structure des anticorps pour leur activité ADCC spécifique du FcgammaRIII. La libération de cytokines telles que IL-2 reflète cette activité.

1

1.

REFERENCES

10

20

Jefferis, R., Lund, J., Mizutani, H., Nakagawa, H., Kawazoe, Y., Arata, Y. and Takahashi, N. A comparative study of the N-linked oligosaccharides structure of human IgG Subclass proteins. Biochem. J., 268: 529-537 (1990).

Leatherbarrow, R.J., Rademacher, T.W., Dwek, R.A., Woof, J.M., Clark, A., Burton, D.R., Richardson, N. and Feinstein, A. Effector functions of monoclonal aglycosylated mouse IgG2a; binding and activation of complement component C1 and interaction with human Fc receptor. Molec. Immun. 22, 407-415 (1985).

Lund, J., Tanaka, T., Takahashi, N., Sarmay, G., Arata, Y. and Jefferis, R.
A protein structural change in aglycosylated IgG3 correlates with loss of hu Fcγ RI
and hu FcγRIII binding and/or activation. Molec. Immun. 27, 1145-1153 (1990).

Parekh, R.B., Dwek, R.A., Sutton, B.J., Fernandes, D.L., Leung, A., Stanworth, D., Rademacher, T.W., Mizuochi, T., Taniguchi, T., Matsuta, K., Takeuchi, F., Nagano, Y., Miyamoto, T. and Kobata, A. Association of rheumatoid arthritis and primary osteoarthritis with changes in the glycosylation pattern of total serum IgG. Nature, 316: 452-457 (1985).

REVENDICATIONS

- 5 1. Procédé pour mesurer l'activation d'une cellule effectrice appartenant au système immunitaire, transformée ou non, par un anticorps monoclonal (AcMo) ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.
 - 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la cellule effectrice est une cellule Jurkat exprimant le récepteur CD16.
- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'on quantifie au moins une cytokine sélectionnée parmi IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, TNFa et IFNγ.
- 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on quantifie 20 l'interleukine IL-2.
 - 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le taux de cytokine produite est un marqueur d'activation ou d'inhibition des cellules effectrices.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le taux d'interleukine IL2 sécrétée reflète la qualité de l'anticorps fixé par le récepteur CD16 quant à son intégrité (fonction FC) et à son efficacité (site antigénique) de liaison à l'antigène.



- 7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le taux d'interleukine IL2 sécrétée est corrélé à une activité du type ADCC.
- 8. Procédé pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

Ce procédé est particulièrement adapté pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal de spécificité anti-Rh du globule rouge humain.

- 9. Procédé pour évaluer la capacité d'une cellule à produire un anticorps monoclonal efficace, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.
- 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que les cellules produisant des anticorps sont choisies parmi CHO, YB2/0, les cellules lymphoblastoïdes humaines, les cellules d'insectes et les cellules de myélomes murines ou tout autre cellule d'expression.
- 11. Procédé pour évaluer l'efficacité et de l'intégrité d'anticorps polyclonaux après une étape ou plusieurs étape de purification, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps purifié et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

- 7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le taux d'interleukine IL2 sécrétée est corrélé à une activité du type ADCC.
- 8. Procédé pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.
- 9. Procédé selon la revendication 8 pour évaluer l'efficacité d'un anticorps monoclonal ou polyclonal de spécificité anti-Rh du globule rouge humain.

- 10. Procédé pour évaluer la capacité d'une cellule à produire un anticorps monoclonal efficace, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence d'un anticorps et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.
- 20 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que les cellules produisant des anticorps sont choisies parmi CHO, YB2/0, les cellules lymphoblastoïdes humaines, les cellules d'insectes et les cellules de myélomes murines ou tout autre cellule d'expression.
- 25 12. Procédé pour évaluer l'efficacité et de l'intégrité d'anticorps polyclonaux après une étape ou plusieurs étape de purification, caractérisé en ce qu'il comprend une mise en contact de cellules effectrice du système immunitaire, transformée ou non, exprimant le récepteur CD16 dans un milieu réactionnel en présence de l'anticorps purifié et de l'antigène dudit anticorps et une mesure de la quantité d'au moins une cytokine produite par la cellule exprimant le récepteur CD16.

- 13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que le mélange réactionnel comprend des d'immunoglobulines humaines (IVIg).
- 14. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 13 pour évaluer la
 production d'AcMo par des plantes transgéniques ou de mammifères transgéniques.
 - 15. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 13 pour sélectionner des anticorps efficace pour un traitement thérapeutique.
- 16. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 13 pour évaluer la capacité des cellules effectrices d'un patient en réponse à un anticorps monoclonal ou polyclonal approprié pour son traitement.

- 13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'on sélectionne les anticorps pour lesquels une augmentation supérieure à 100%, 250%, 500%, ou 1000% du taux de libération d'IL-2 est observée par rapport au contrôle en absence d'anticorps ou en présence d'un anticorps donné comme référence négative.
- 14. Procédé selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que le mélange réactionnel comprend des d'immunoglobulines humaines (IVIg).
- 15. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 14 pour évaluer la production d'AcMo par des plantes transgéniques ou de mammifères transgéniques.
 - 16. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 14 pour sélectionner des anticorps efficace pour un traitement thérapeutique.

. 5.2

17. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 14 pour évaluer la capacité des cellules effectrices d'un patient en réponse à un anticorps monoclonal ou polyclonal approprié pour son traitement.

15 .

ADCC CMN sur hématies




FIGURE 1

ADCC NK sur hématies




FIGURE 2

ADCC NK . Inhibition en presence de l'anti-CD16 : 3G8 Tox 324 02 015




FIGURE 3

Activation de Jurkat CD16 induite par un anti-Rhésus D et production d'IL2




FIGURE 4

Activation de Jurkat CD16 induite par un anti-Rhésus D et production d'IL2




FIGURE 5



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº1...?...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 27060)

	out impliffic cot a forigin hot	CHOICE OF CHOIC HOUG	00 125 11 / 2/0001
Vos références pour ce dossier (facultatif)	239864 NT		
N° D'ENREGISTREWENT NATIONAL	0211416		
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			

MESURE DE LA PRODUCTION DE CYTOKINES COMME MARQUEUR D'ACTIVATION DE CELLULES EFFECTRICES

LE(S) DEMANDEUR(S):

LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES : Zone d'activité de Courtaboeuf 3 avenue des Tropiques 91940 LES ULIS FRANCE - FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):

		The second se	
醒	Nom .		de ROMEUF Christophe
	Prénoms		
	Adresse	Rue .	116, rue de la Bassée
		Code postal et ville	5900 LILLE FR
Société d'appartenance (facultatif)		artenance (facultatif)	
2	Nom Prénoms		GAUCHER Christine
	Adresse	Rue	32, rue des Mésanges
		Code postal et ville	59320 SEQUEDIN FR
Société d'appartenance (facultatif)		artenance (facultatif)	
133	Nom State of the s		GLACET Amaud
	Prénoms		
	Adresse	Rue	46 rue Ringot
		Code postal et ville	59147 GONDECOURT FR
Société d'appartenance (facultatif)		artenance (facultatif)	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

Marty 921168



BREVET D'INVENT

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis. rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire Vos références pour ce dossier (facultatif) n° d'enregistrement national TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) MESURE DE LA PRODUCTION DE CYTOKINES COMME MARQUEUR D'ACTIVATION DE CELLULES EFFECTRICES. LE(S) DEMANDEUR(S): LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES : Zone d'activité de Courtabocuf 3. avenue des Tropiques 91940 LES ULIS FRANCE - FRANCE DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : Nom Prénoms DHAINAUT Frédéric Rue Adresse Code postal et ville 4. rue de Dourdan Société d'appartenance (facultatif) 91870 BOISSY LE SEC Nom Prénoms **BOUREL** Dominique Adresse Code postal et ville 35 Javenhel Germaine Société d'appartenance (facultatif) 59110 LA MADELEINE Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** 921163 (Nom et qualité du signataire)

loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à le formulaire.



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.